

การฉีดวัคซีนคอตีบ ไอกรน และบาดทะยักในหญิงตั้งครรภ์

แพทย์หญิงชญญา รักประสิทธิ์

ปัจจุบันหญิงตั้งครรภ์แนะนำให้มีการฉีดวัคซีนรวมป้องกันคอตีบ ไอกรน และบาดทะยัก (Tdap) หรือ วัคซีนป้องกันไอกรน (acellular pertussis: aP) ทุกการตั้งครรภ์ ซึ่งวัคซีนนี้ปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์ และมีความสำคัญโดยสามารถส่งภูมิคุ้มกันป้องกันโรคไอกรนไปให้ทารกได้ อายุครรภ์ที่แนะนำให้ฉีดอยู่ระหว่าง 27-36 สัปดาห์ รายละเอียดวัคซีนขึ้นกับประวัติการฉีดวัคซีนบาดทะยักก่อนหน้า

การพิจารณาการฉีดวัคซีน

→ หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนบาดทะยักมาก่อน หรือจำประวัติการฉีดวัคซีนบาดทะยักไม่ได้
แนะนำให้ฉีดวัคซีนบาดทะยักให้ครบ 3 เข็ม

- เข็มแรก: ตอนฝากครรภ์ครั้งแรก
- เข็มที่สอง: ฉีดวัคซีน Tdap ที่อายุครรภ์ 27-36 สัปดาห์
- เข็มที่สาม: ฉีดหลังคลอด

* วัคซีนแต่ละเข็มต้องห่างกันอย่างน้อย 4 สัปดาห์

→ หญิงตั้งครรภ์ที่เคยฉีดวัคซีนบาดทะยักครบระยะเวลาเกิน 10 ปี

- แนะนำฉีดวัคซีน Tdap ในช่วงอายุครรภ์ 27-36 สัปดาห์ หรือ ฉีดวัคซีนบาดทะยักกระตุ้น 1 เข็ม

→ หญิงตั้งครรภ์ที่เคยฉีดวัคซีนบาดทะยักครบระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี

- แนะนำฉีดวัคซีน Tdap หรือ aP ในช่วงอายุครรภ์ 27-36 สัปดาห์