




แผลมะเร็งดูแลอย่างไร




การติดเชื้อ

- ❑ ทำแผลด้วยน้ำเกลือ ไม่ควรใช้โปรวิดิน ไฮโดรเจน-เปอออกไซด์
- ❑ หากแผลติดเชื้อ ควรไปพบแพทย์ เพื่อรักษา โดยการให้ยาปฏิชีวนะ




กลิ่น

- ❑ ทำแผลทุกวันอย่างถูกวิธี
- ❑ สามารถใช้ยาเมโทรนิดาโซลบด แล้วโรยแผล หรือผสมกับ KY-gel ก่อนใส่แผล



อาการเลือดออก

- ❑ ค่อยๆดึงวัสดุทำแผลออกอย่างเบามือ
- ❑ ถ้าติดแน่นมาก ให้ใช้น้ำเกลือราดให้ชุ่มก่อนลอก วัสดุทำแผลออก
- ❑ ถ้ามีเลือดออกให้กดแผลไว้นาน 10-15 นาที
- ❑ ใช้อะดรีนาลีน 1:1000 ชุบก๊อสให้ชุ่มแล้ว วางบนแผล



อาการปวด

- ❑ พิจารณาให้ยาลดปวด เช่น พาราเซตามอล
- ❑ หากมีอาการปวดมาก ปวดต่อเนื่อง อาจพิจารณาให้ยาในกลุ่มโอปิออยด์ เช่น ทรามาดอล, มอร์ฟิน
- ❑ การปวดที่เกิดจากมะเร็งลุกลามไปถึงเส้นประสาท เช่น ปวดแสบปวดร้อน พิจารณาให้ยาในกลุ่มลดปวดปลายประสาท เช่น กาบาเพนติน หรือกลุ่มต้านซึมเศร้า เช่น อะมิทริปไทลีน

คณะผู้จัดทำ
ชุดนิเทศน์ สิ้นนอก,นันทวัน สุตโต,นพพันธ์ วิหคไพบูลย์,ณิชากรมล อารยะถาวร,ศกุนรี อินเกต

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.พญ.วัชรภรณ์ ตาบุรี

เอกสารอ้างอิง



อาการคัน

- ❑ ทาวาสลีนบริเวณผิวหนังรอบๆแผล เพื่อป้องกันไม่ให้สารคัดหลั่งโดนผิวหนังโดยตรง
- ❑ หากมีอาการคันมาก อาจแจ้งแพทย์เพื่อขอยาลดอาการคันได้

