


MACHU PICCHU

การเตรียมตัวด้านสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยว

มาชูปิกชู เป็นซากอารยธรรมโบราณของชาวอินคาในประเทศเปรู ตั้งอยู่บนเทือกเขาสูง 2,350 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นศูนย์กลางที่มีความสำคัญทางโบราณคดีของอเมริกาใต้ และยังได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก



Inca rail trekking

Sun Temple

The House of Incas

Sacred valley

Mandor Gardens

ปัญหาสุขภาพที่ควรเฝ้าระวัง



- โรคประจำตัวกำเริบ
- ภาวะแพ้ที่สูง (High Altitude Sickness)



- โรคระบาดประจำถิ่น : ไข้เหลือง (Yellow fever), มาลาเรีย (Malaria)
- โรคระบาดอุบัติใหม่ : Covid-19



- โรคจากสิ่งแวดล้อม : แสงแดด อาหารปนเปื้อน
- โรคติดเชื้ออื่น : ไวรัสตับอักเสบ เชื้อปรสิต



- อื่นๆ : อุบัติเหตุ อาชญากรรม แมลงสัตว์กัดต่อย

ก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว



พริชา 90 วัน

Hola!

ภาษาสเปนในการสื่อสาร



สกุลเงิน
เปรูวียาลนีโอโซล



ช่วงเหมาะสม
พฤษภาคม-กันยายน



Self care : ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง



Planning : เตรียมตัวและวางแผนการเดินทางล่วงหน้า



Tour : เลือกบริษัททัวร์และไกด์ที่น่าเชื่อถือ



Travel insurance : ซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันภัยสุขภาพ



Travel medicine :ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การท่องเที่ยวก่อนเดินทาง 4-6 สัปดาห์

การฉีดวัคซีนก่อนเดินทาง

วัคซีนไข้เหลือง (Yellow fever vaccination)

- ต้องฉีดตามกฎหมาย
- ฉีดก่อนเดินทาง 10 วัน



วัคซีน COVID-19

- แนะนำให้ฉีดจนครบก่อนเดินทาง

วัคซีนพิษสุนัขบ้า



- กรณีพักอาศัยนาน แนะนำให้ฉีด

สถานที่ฉีดวัคซีน : คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง มุมหัดส, สถานเสาวภา, สภากาชาดไทย, สถาบันปราชญ์รัตนสูตร, ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

High Altitude Sickness

ภาวะแพ้ที่สูง เกิดจากการเดินทางไปยังพื้นที่สูงเหนือระดับน้ำทะเลมาก ซึ่งมีอากาศเบาบาง ร่างกายยังไม่สามารถปรับตัวเข้ากับความสูงนั้นได้ ทำให้เกิดความผิดปกติในร่างกายตามมา

- เกิดอาการในช่วง 2-10 ชั่วโมง



ปวดศีรษะ



เวียนศีรษะ



คลื่นไส้/อาเจียน



เหนื่อย/หายใจเร็ว

อุปกรณ์การเดินทาง



อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
ยาประจำตัว, ยาแก้ปวด



เสื้อผ้าแขนยาว
ชุดกันฝน



รองเท้าผ้าใบ/รองเท้า
สำหรับปีนเขา



น้ำดื่ม



อาหาร



ครีมกันแดด



โทรศัพท์/
วิทยุสื่อสาร



แนวทางการป้องกันภาวะแพ้ที่สูง



- การปรับตัว (Acclimatization) ไม่ขึ้นสู่ที่สูงเร็วเกินไป ควรพักที่เมืองที่อยู่ต่ำกว่า 1-2 วัน



- ใช้ยา Acetazolamide (Diamox) ในบางราย ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอ

คำแนะนำเมื่อมีอาการภาวะแพ้ที่สูง



- หยุดพักจนอาการดีขึ้น จึงเดินทางต่ออีกครั้ง
- หากหยุดพักแล้วอาการไม่ดีขึ้น เดินทางลงไปยังพื้นที่ที่มีความสูงต่ำกว่า



- พบแพทย์ที่โรงพยาบาลท้องถิ่นเพื่อช่วยประเมินอาการ

ระหว่างเดินทางท่องเที่ยว

พกเอกสารสำคัญติดตัวเสมอ

- เอกสารประกันภัยและประกันสุขภาพ
- เอกสารกำกับยาประจำตัว
- วิธีติดต่อกรณีฉุกเฉิน

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน

ติดต่อบริษัทประกันภัย ไกด์ หรือโรงพยาบาลท้องถิ่น



สังเกตอาการผิดปกติอยู่เสมอ



ระมัดระวัง : อุบัติเหตุ สัตว์กัด
ยุง/แมลงกัด การบริโภค

หลังจากเดินทางท่องเที่ยว

คนทั่วไป

- ไม่ต้องกักตัวแต่ให้สังเกตอาการผิดปกติ
- ยกเว้นสถานการณ์ COVID-19

ต้องมีการกักตัวตามมาตรการ

บุคคลที่ควรพบแพทย์

- มีโรคประจำตัว มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง
- มีอาการผิดปกติใน 3 เดือนหลังกลับ เช่น ไข้สูง
ตัวเหลือง/ตาเหลือง อจากร่วงเรื้อรัง
ผื่น/แผลบริเวณผิวหนัง

จัดทำโดย นิสิตแพทย์ปิยะพร อริโซตสกุล ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร



ข้อมูลเพิ่มเติม



แบบทดสอบและประเมินผลงาน

ขอขอบคุณ : Thai Travel Clinic, CDC,
กรมควบคุมโรค, Mangozero Blog